



## GAMMA® anti-D 150

*Immunoglobulinum humanum anti-D*

ATC: J06BB01

Roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 150 µg

**Skład:** Immunoglobulina ludzka anti-D, 150 µg.

**Substancje pomocnicze:** Glicyna, Sodu chlorek, Woda do wstrzykiwań.

### Wskazania do stosowania:

- I. Produkt podaje się po porodzie gdy spełnione są następujące warunki:  
Matka Rh ujemna (D-). Nieobecne przeciwciała anti-D (anti-Rh) w surowicy matki. Dziecko jest Rh dodatnie (D+). Bezpośredni test antyglobulinowy (bezpośredni test Coombsa) u dziecka jest ujemny. Wskazania ustala się na podstawie następujących badań serologicznych: Określenie grupy AB0 i Rh u matki, a po porodzie także u noworodka. Poszukiwanie przeciwciał anti-D w surowicy matki za pomocą testu papainowego i pośredniego testu antyglobulinowego. Wykonanie po porodzie bezpośredniego antyglobulinowego (bezpośredniego testu Coombsa) z krwinkami dziecka.
- II. Produkt podaje się podczas ciąży: kobietom Rh ujemnym w 28 tygodniu ciąży, u których nie wykrywa się przeciwciał anti-D testem papainowym i antyglobulinowym.
- III. Produkt podaje się po usunięciu płodu powyżej 12 tygodnia ciąży, w zagrażającym porodzie niewczesnym lub przedwczesnym, po amniopunkcji diagnostycznej powyżej 12 tygodnia ciąży: kobietom Rh ujemnym, u których nie wykrywa się przeciwciał anti-D.

**Okres ważności:** 1 rok

**Przechowywanie:** W temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Chronić od światła.

**Opakowanie:** 1 ampulka o pojemności 1 ml z roztworem 150 µg.

**Rp.** - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza



„BIOMED-LUBLIN” Wywórnia Surowic i Szczepionek S.A.

[www.biomed.lublin.pl](http://www.biomed.lublin.pl)